

符合WS/T 509规范
推荐ICU使用



ICS 11.020
C 05

WS

中华人民共和国卫生行业标准
WS/T 509—2016

重症监护病房医院感染预防与控制规范
Regulation for prevention and control of healthcare associated infection in intensive care unit

11.1
医疗区域的物体表面应每天清洁消毒
1-2次，达到**中水平消毒**；
12.1
床栏、床旁桌、床头柜等应每天清洁
消毒1-2次，达到**中水平消毒**。

+ PDI®

ICU解决方案



美国、中国CDC双重检测
可杀灭TB结核杆菌、脊灰病毒
达到中水平消毒的消毒湿巾

切断传播途径是关键

高频接触表面中, 有70%没有被有效清洁
改善环境表面的清洁与消毒质量, 可以降低HAI的发生率



实验证明 使用PDI消毒湿巾有效降低HAI

Project: Clean Sweep Reducing Healthcare-associated Infections, Employee Absenteeism, Healthcare Cost and Hospital Readmissions in a Long Term Care Facility

制订并实施表面消毒湿巾和手部消毒湿巾的标准方案, 医院各个位置都配备了墙面托架和地板支架, 也放置于药物推车、病房服务车等地方。

有效减少HAI, 节省人员作业时间, 降低医疗成本和再入院率




Presented at the 37th Annual Meeting of the Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology; July 11 - 15, 2010; New Orleans, LA. Abstract 8-080

The Role of Education and Point of Care Use in Appropriate Surface Disinfection Compliance

在便利的取用点摆放消毒湿巾, 定期的教育培训和张贴教育海报, 针对不同设备表面, 选择不同的消毒湿巾

增加使用消毒湿巾的依从性, 降低了多重耐药菌的患病率



Presented at the Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology Annual Conference 2013



杀菌效果强

通过美国EPA认证
经中国权威CDC检测



所需时间短

美国检测报告
30秒即可杀灭病毒



成份有效析出

有效成分不被湿巾吸附
用挤出液做测试而不是
用原液



兼容性高

不腐蚀不伤仪器
擦拭后不留痕迹



依从性佳

随抽随用省时间
湿巾大小合手有效施力



开盖后有效期长

特殊双层上盖
密封效果好



Super含醇型

可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、
致病性酵母菌、医院感染常见细菌、
结核杆菌

- 复合季铵盐+异丙醇成分
- 可杀灭TB结核杆菌、MRSA
- 迅速消毒，周转快
- 作用时间*：2分钟



Bleach含氯型

可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、
致病性酵母菌、医院感染常见细菌、
结核杆菌、可灭活病菌

- 含6000ppm有效氯
- 可达到中水平消毒
- 可灭活病毒，可杀灭TB结核杆菌、MRSA
- 美国检测，可杀灭C.Diff艰难梭菌孢子、诺如病毒
- 适用于高风险区域
- 作用时间*：4分钟

订购号

湿巾尺寸

包装

Super Sani-Cloth® 物表消毒湿巾-含醇型

大罐	Q55172	15×17厘米	160/罐，12罐/箱
超大罐	Q86984	19×38厘米	65/罐，6罐/箱

Sani-Cloth® Bleach物表消毒湿巾-含氯型

大罐	P54072	15×27厘米	75/罐，12罐/箱
超大罐	P25784	19×38厘米	65/罐，6罐/箱
大盒(单片装)	H58195	13×18厘米	40/盒，10盒/箱

※ 作用时间：从湿巾接触到物体表面开始计算，此时间内表面不被干扰且保持湿润，并非持续擦拭时间。

对抗医院感染，是我们共同的使命。 Our Mission: Zero HAI



8.1.3 宜使用有效含量 $\geq 2\text{g/L}$ 氯己定-乙醇（70%体积分数）溶液局部擦拭2-3遍进行皮肤消毒，……。


10.1 应配备足够的非手触式洗手设施和速干手消毒剂，……。每床应配备速干手消毒剂。

10.4 探视者进入ICU前后应洗手或用速干手消毒剂消毒双手。



Sani-Hands 手部消毒湿巾

- 15秒内有效杀死99.99%病原体
- 杀菌力比凝胶强13.5倍
- 有效去除脏污，清洁消毒一步完成
- 成分安全，使用后可直接接触食物



Prevantics Device 无针接头消毒

- 含3.15%葡萄糖酸氯己定，杀菌速度比2%快
- 擦5秒干5秒，时间短依从性佳
- 美国临床实验证明，显著减少CLABSI



无醇型
物表消毒湿巾



洗必泰
皮肤消毒系列



术前消毒
皮肤擦拭棒



术前洗必泰
沐浴海绵



屏幕专用
70%异丙醇湿巾

美国进口 EPA认证 专业消毒湿巾品牌
NO.1 DISINFECTING WET WIPE IN USA AND IN THE WORLD

