



Prevantics®

第一个也是唯一一个经美国食品药品监督管理局(FDA)批准, 由 3.15% 葡萄糖酸氯己定和 70% 异丙醇溶液制成的皮肤消毒系列产品, 具有长达 7 天的持久抗菌性能*, 能够有效预防医院感染 (HAI)。

* 适用于擦拭棒和大号擦拭棒

 **PDI®**
BE THE DIFFERENCE™

面临的挑战

2011 年，美国医院感染（HAI）病例约为 72.2 万例，其中死亡病例约为 7.5 万例。¹ 医院感染影响了千千万万的人，包括患者、患者家属以及其他所有关爱他们的人。同时，医院感染也增加了患者住院花费，不利于提高医疗效果。

美国疾病控制与预防中心（CDC）统计，每增加一例中央导管相关血流感染（CLABSI），医疗花费就会相应增加 1.655 万美元。²

解决方案

Prevantics®系列产品，由3.15%葡萄糖酸氯己定（w/v）和 70%异丙醇（v/v）制成，有利于预防各类感染，提高医疗效果。



为便利而设计

Prevantics®系列产品十分方便，使用前不需要打破玻璃或做其他激活手续。

产品特点

- 不需要打破玻璃
- 无需使用前激活
- 即拆即用
- 易拆封，方便使用
- 预湿润
- 擦片：直观的医用擦片设计
- 擦拭棒：独特的双面设计，可用于指缝以及皮肤褶皱处



Prevantics® 1.0 mL 擦片



Prevantics® 1.6 mL 带柄擦拭棒



Prevantics® 5.1 mL 大号擦拭棒

1 CDC HAI Prevalence Survey. Magill SS, Edwards JR, Bamberg W, et al. Multistate Point-Prevalence Survey of Health Care-Associated Infections. N Engl J Med 2014;370:1198-208.

2 CDC Vital Signs: Central Line-Associated Blood Stream Infections -United States, 2001, 2008 and 2009. MMWR Weekly, March 4, 2011, 60(08);243-248.



Prevantics®系列产品独特之处

使用	24 小时后	36 小时后	48 小时后 (2 天)	96 小时后	120 小时后	144 小时后	168 小时后 (7 天)
----	--------	--------	-------------------	--------	---------	---------	--------------------



临床病例研究

Rush-Copley 医疗中心表示，第 1 年，该院中央导管相关血流感染（CLABSI）病例数降低了 59%，第 4 年降低了 100%



为了预防感染以及血管通路问题的发生,降低中央导管相关血流感染 (CLABSI) 发生率, Rush-Copley 医疗中心调整了治疗方案, 改用 Prevantics® 系列产品。³

4 Marlowe, Lauren; Mistry, Rakesh D. et al. Blood Culture Contamination Rates after Skin Antisepsis with Chlorhexidine Gluconate versus Povidone-Iodine in a Pediatric Emergency Department. *Infection Control and Hospital Epidemiology*. February 2010, vol. 31, no. 2.

Prevantics®系列产品即拆即用，操作简便，有擦片、擦拭棒、大号擦拭棒3种类型，可依不同需求选择。

产品特性

省时	- 易拆封装，不含玻璃 - 预先湿润，无需使用前激活 - 独特双面设计*
省钱	对皮肤进行有效抗菌，有利于提高医疗效果，降低医疗成本
提高效果	- 抗菌效果长达 7 天之久* - 经独立研究得出的临床概要 14个以Prevantics®系列产品抗菌性能为研究对象的独立临床试验
符合循证临床指南和建议	Prevantics®系列产品皆符合以下规范：       

*适用于擦拭棒和大号擦拭棒

订购须知

独立盒	订购号	每盒数量	每箱盒数	最大处理区域面积
Prevantics®擦片 1mL 注射前备皮	B10800	100	10	36平方厘米
Prevantics®擦拭棒 1.6mL 注射前和术前备皮	S40750	50	10	干燥部位：100平方厘米 湿润部位：93.75平方厘米
Prevantics®大号擦拭棒 5.1mL 注射前和术前备皮	S41950	30	10	干燥部位：324平方厘米 湿润部位：142.5平方厘米

分装盒	订购号	每盒数量	每箱盒数	最大处理区域面积
Prevantics®擦片1mL 注射前备皮	B11400	3000	1	36平方厘米
Prevantics®擦拭棒 1.6mL 注射前和术前备皮	S32450	500	1	干燥部位：100平方厘米 湿润部位：93.75平方厘米
Prevantics®擦拭棒 1.6mL – 短杆型 注射前和术前备皮	S42850	500	1	干燥部位：100平方厘米 湿润部位：93.75平方厘米
Prevantics®大号擦拭棒 5.1mL 注射前和术前备皮	S27350	300	1	干燥部位：324平方厘米 湿润部位：142.5平方厘米

干燥部位:没有皮肤折皱，毛发较少，如：前臂、腹部。

湿润部位:有皮肤折皱，毛发较多，如：腹股沟部、液窝

PDI 碧谛艾医疗器械(上海)有限公司
电话: (021) 6235-1828 | 传真: (021) 6235-1768 | www.pdihc.cn

© 2014 Professional Disposables International, Inc. 版权所有

